

ESCARABAJO ASIÁTICO DE CUERNOS LARGOS

CICLO DE VIDA



Huevos



Larva(s)



Pupa



*Tamaño real del agujero de salida

FÍJESE EN LO SIGUIENTE

- Escarabajos adultos en el verano y principios de otoño
- Agujeros redondos con diámetro de al menos tres octavos de pulgada
- Hoyos en la corteza hechos por el escarabo hembra en los que deposita los huevos
- Acumulación de material parecido al aserrín (excrementos del insecto) alrededor de la base del árbol o de las ramas
- Muerte regresiva en el follaje del árbol o cambio en el color de las hojas fuera de temporada
- Exudación de savia por los hoyos, especialmente en los arces



Agujeros redondos



Hoyos en la corteza



Material parecido al aserrín



Muerte regresiva

EL DAÑO QUE CAUSA

El escarabajo asiático de cuernos largos afecta el flujo de agua y los nutrientes en el árbol, desde las raíces hasta su frondoso follaje. Una vez que dichas vías se afectan lo suficiente, el árbol infestado morirá.

LO QUE USTED PUEDE HACER

- **No mueva la leña cruda**, pues podría estar moviendo una plaga.
- **La detección temprana** es importante; aprenda sobre el insecto y el daño que causa.
- **Inspeccione** los árboles con regularidad y reporte todo signo o señal en **PlagasHambrientas.com** o llamando al **1-866-702-9938**.

Para obtener más información, visite:

PLAGASHAMBRIENTAS.COM



Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas

El Departamento de Agricultura de EEUU es un proveedor y empleador que ofrece igualdad de oportunidades. Material del programa núm. 2125-ALB-5 Publicado en septiembre de 2012